



Petrus Thorstensen.

*De scirpis in Dania
sponte nascentibus.*

1770.





580

Pēt

DISSERTATIO BOTANICA
DE
SCIRPIS
IN DANIA SPONTE
NASCENTIBUS,

QVAM
PUBLICO OPPONENTIUM EXAMINI SUBMITTIT
PETRUS THORSTENSEN,
PARTES DEFENDENTIS ORNANTE
NICOLAO MOHR,

STRENUSSIMO MEDICINÆ CULTORE.

Landsbokasager

IN AUDITORIO
COLLEGII MEDICEI.

DIE DECEMB. MDCCLXX.

H A F N I Æ,
typis Viduæ A. H. Godiche, S. R. M. Universit. Typograph.

STATION

2-7-11-11-11

5-11-11-11

1-11-11-11

1-11-11-11

1-11-11-11



L. B.



Dissertationem pro stipendio, quo fruor, medico exhibiturus, specimen tibi botanicum offerre, statim mecum reputavi, cum vero mihi nullæ ad manus erant describendæ plantæ, ab aliis authoribus nondum descriptæ, quem etiam laborem meas omnino vires superare credebam, satius fore judicavi, si plantas quasdam ab aliis speciatim descriptas colligerem, ultro describerem & juxta methodum linneanam disponerem. Hac igitur vice Scirpos in Dania nascentes speciminis loco describendos suscepi. Quod quidem specimen,

si nimis tibi visum fuerit immaturum, indulgeas quæso his nostris laboribus, utpote primis in campo botanico susceptis; Ea enim, quæ forsân nimis imperfecta occurrunt, vel quæ plane deficiunt, in ejusmodi descriptionibus tamen observanda, alia vice magis correctâ & accurata tibi proponere pollicemur.

Sicut *Scirpo* varia apud antiquiores imposita erant nomina, ita varios tenebat classes & ordines, secundum methodum authorum in classes & ordines plantarum distinguendas, sic *Scirpus* invenitur

Secundum *Hermanni* methodum inter *Staminosas*, non *culmiferas*:

Secundum *Boerhavii* methodum inter *monocotyledones apetalos caule teretiusculomedulla fungosa*;

Secundum *Ruppii* methodum inter *Stamineos*,

Secundum *Raji* methodum inter *graminibus affinia*.

Secundum *Tournefortii* methodum inter *flores apetalos collectos in capitulum squamosum*.

& Secundum celeberrimi *Linnei* methodum maxime usitatisimum, locum tenet inter *triandros monogynias*, hancque methodum ut maxime systematicam ejusque subdividendi & describendi formam in hac secutus sum dissertatione.

Scirpus Tournefort 300. *Scirpo Cyperus Mich.* 31.

Calyx. univalvis in *amento* imbricato squamis ovatis, plano inflexis flores destingventibus

Corolla

Corolla nulla

Stamina, *filamenta* tria *Anthææ* oblongæ

Pistil: *Germen* minimum, *Stylus* filiformis, *Stigmata*
tria capillaria

Per. nullum

Semen unicum triquetrum acumdatum, subnudum,
pilis minimis calyce brevioribus basi insertum.

Dantur inter calamaria varia genera, quæ peregrinis studio botanico cum *Scirpis* facile confunduntur, quare inanteceßum accuratius illa determinare criteria, quibus *Scirpus* vel *Genus Scirpi* ab aliis differt, quibus convenit, illaque genera *Scirpo* convenientia enumerare necesßum ducó

a) *Cyperus* maximam inprimis cum *Scirpo* habet similitudinem & affinitatem, & tantam quidem, ut celeberrimus *Linnaeus* dubius hæferit, num illa separet, v. conjunget.

Conven. *Cyperus* habet calycem univalvem, Corollam nullam, ita *Scirpus*.

Discon. *Cyperus* habet amentum distichum & Semen nudum. *Scirpus* e contrario amentum undique imbricatum, quæ nota generica infallibilis est ad distingvendum a *Cypero*: Semenque pilis minimis instructum.

ß) *Carex* cum *Scirpo* in multis magnam habet similitudinem.

Conven. *Carex* habet calycem univalvem in amento imbricato & nullam corollam,

Discon. E contrario gaudet criteriis ad distingvendum a *Scirpo* sufficientibus, nam in carice, sunt flores masculini & feminini distincti, quare & locum

tenet systematicum in classe vigesima prima monoecia dicta & semen obvestitum nectario bidentali, hæ duæ sunt certissimæ & ad *Scirpum* a *carice* distingvendum infallibiles notæ.

Eriophorum cum *Scirpo* in multis convenit, in paucis vero discrepat:

Conv. Gaudet calyce univalvi in amento imbricato & nulla corolla,

Discon. Semen e contrario Eriophori Lanigerum est unica infallibilis nota, nam villis gaudet longissimis calyci multo longioribus, cum *Scirpi* Semen pilis raris minimis & supra calycem minime elatis instructum est.

Numerus specierum sub hoc genere complexarum ad viginti quatuor indagatus, & distinctæ, mox apparentes notæ characteristicæ ansam dederunt celeberrimo Linnæo variis sequentibus necessariis subdivisionibus, quas enumerare necessarium.

Dantur igitur *Scirpi* α Spica unica

β Culmo tereti polytachio

γ Culmo triqvetro panicula nuda

δ Culmo triqvetro panicula foliacea

Nostri Daniæ littora varias nobis præbent species ad has pertinentes subdivisiones, ad quas enumerandas illarumque notas specificas exacte determinandas me convertito.

α) *Scirpi* Spica unica

1 *Scirpus palustris danic.* Sif med Hæsterumpes Knoppe German. Sumpfbinsen, colbigter binßen, Svecis Knappfaff, Bahufis, Salta.

Scirpus

Scirpus eqvifeti capitulo majori Scheuz. Hist 360
Scirpus — — — *alter* — 361
Juncellus Cyperoides, capitulo simplici J. Læf. Flor.

Pruf. I-30

Juncus capitulis eqvifeti major Bauh. pin. 12 thar. 187

Scirpus culmo tereti nudo, fpica fubovata terminali
 Lin. flor. Svec 41-42

Radix repens, fibrofa, lineas tres qvatuorve crassa, fibrisque constat nigris fufcis & albis, intus ligneis.

Culmus, erectus, teres, nudus, subtiliffime ftriatuſ, ſesquipedalis imo bipedalis altitudinis, lineæ unius & duarum etiam dimiduæ ad baſin craſſitiei, dehinc ſenſim attenuatus. Interne medulla valde laxa, membranuliſque conſtans fuſcis, itaqve mollis, ut veluti cavus totus eſſe videtur, inde a radice uſque ad triunciale ſpatium, duabus plerumque tunicis veſtitus, plus minus membranaceis.

Culmi ſumitati infidet

Amentum oblongum, ſubovatum, acuminatum, denſiffime imbricatum, lineas qvatuor aut ſemunciam longum & unam cum dimidia latum. *Squamæ* ovatæ acuminatæ concavæ & membranaceæ lineam unam longæ, dimidiam fere latæ, baſi albicantes, carina ſubfuſca.

Stamina, filamenta tria filiformia longitudine ſquamarum. qvarum baſi inſerta, *Antheræ* oblongæ ſubulatæ,

Piſtil *Germen* ſubovatum minimum

Stylus capilaris calyce brevior, *Stigma* biſidum

Semen ſubrotundum ovatum, deſinit in acuto nigro appendice, ad baſin raris villis inſtructum.

Locus

Locus habitat undiqve in Daniæ fluviis locisque inundatis
Medio Junii, ad finem floret, & initio augusti semen,
gerit maturum.

Ufus *Suibus* recens pabulum est gratisimum.

II. *Scirpus acicularis* danice Naal Sif German *Moos-
binfen* Svec. *Naal-Saf*.

Scirpus magnitudine aciculæ Flor. Lap. 21

Scirpus omnium minimus capitulo longiori Tournef.
inst. 528

Scirpus minimus spica breviori squamosa spadicea Scheuz
hist. 364

Juncus parvus palustris cum parvis capitulis eqviseti
Raji hist. 1306

Scirpus culmo tereti nudo setiformi, spica ovata bi-
valvi, terminali, seminibus nudis Lin. Fl. Svec.
43.

Radix tenuis minima constans fibris tenuibus fuscis aut
nigricantibus.

Culmus, teres, minimus, vix superans tripollicarem lon-
gitudinem, & duplam setæ eqvinæ crassitiem plus
minus, semunciam super radicem vestitur vagina
membranacea amplexicauli truncata, nunc dilu-
tius nunc obscurius fusca.

Culmi summitati insidet

Ammentum ovatum, minimum, lineas duas aut tres lon-
gum, utrinque aliquantisper mucronatum, &
lineam unam cum dimidia latum, duabus con-
stans glumis exterioribus, præ cæteris conspicu-
is propter magnitudinem, reliquæ internæ ab-
sconditæ, & densius imbricatæ in dictas duas
glumas latent.

Stamina

Stamina filamenta tria minima longitudine glumæ. Anth. minima.

Pistil. tenuissimum cirrosum Stigma trifidum

Semen triquetrum minimum.

Locus habitat ad ripas fluviorum & lacuum, sæpius sub ipsa aqua inundatur, in insula amagriæ & quam plurimis Daniæ palludosis locis frequens.

III. *Scirpus fluitans* Svec. *Moosa Taf* Danic. *Sif med rødagtige Blomstere.*

Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis spica terminali Gvett. Stamp. 141.

Scirpus caule folioso flaccido, scapis alternis capitatis Roy Lugdb. 49. Sauv. monsp. 9.

Scirpus equiseti capitulo minori. T. Schæuz. gram. 365 t. 7. fig. 20.

Juncellus capitulis equiseti, minor fluitans Bauh pin. 12. prodr. 23. theath. 187.

Gramen juncum clavatum minimum Raj hist 1310. Moriss. hist. 3. p. 230. fig. 8. t. 16. f. 31. Pluch. alm. 180. t. 35. fig. 1.

Scirpus culmis teretibus nudis alternis caule folioso flaccido Lin. spec. pl.

Radix geniculata striata fibrosa subfusca

Culmus, geniculatus, defusus, teres, foliosus, ramosus, a singulo culmi geniculo, semi pollicem ab invicem distanti, oritur folium fere unciale striatum glabrum, vagina amplexicauli striata glabra, lineas tres quatuorve circiter longa instructum, in obtusiusculum mucronem terminatum.

Amentum subovatum, longitudine fere unicale a medio dorso, ad alterutram oram lineæ trientem plus minus latum.

Stamen filamenta tria capillaria anth. minimæ

Pistil minimum. Stig. trifidum.

Semen oblongum compressicolum pallidum & albicans
lineam dimidiam longum ad basin angustum de-
hinc versus mucronem sensim dilatatum.

Locus habitat in Dania ad littora Lacuum.

Scirpi

β Culmo tereti polytachio

Scirpus lacustris Dan. Støer St. Germ. Teich binsen.
Svec. Sio-suf. Upland. Kalvass.

Scirpus spicis copiosis. Roy Lugdb. 48.

Juncus maximus, f. *Scirpus major*. Bauh. pin. 12. theath.
178.

Scirpus culmo tereti nudo, spicis pluribus peduncalatis
terminalibus Linn. Flor. Svec. 40. Sp. pl. 48.

Radix perennis valida, semunciam, quandoque unciam
crassa, repens. A radice primo prodeunt radi-
culæ, ex his radiculis iterum fibræ tenuissimæ,
albicantes, nigrae & subituse, quæ per radicu-
larum longitudinem, densissime sunt protense.
Radix interne medulla spongiosa, externe tunica,
fusca & infibras tenuissimas fissa tota tecta.

Culmus strictus, teres nudus, enodis, paniculatus, in-
terne medulla spongiosus, facile compressibilis
& a cortice separabilis, ad basin complectitur non-
nullis tunicis membranaceis, fuscis, hinc inde
fluctuantibus, juxta culmum communiter sur-
gunt fasciculi foliorum quidam, quæ folia fere
bicubitalia sunt, angusta, lineasque duas fere lata,
arte iurata, flexilia, dilute viridia ad basin se mu-
tuo amplexantia. Hexapeda, circiter culmi al-
titude,

titudo, unica prope radicem fere uncia, frequentissime vero semuncia est crassities.

Panicula sparsa per intervalla, pedunculos habet, tam unciales, quam sesquiunciales, hi uno latere sunt plani, v. admodum concavi, marginibus subserati, altero latere convexi & gibbi, prodit panicula e sinu duorum foliorum ex adverso positorum, quorum longius quadriunciale aut biunciale, vagina membranacea semunciali instructum, brevius autem vaginam representat fuscum, membranaceam, uncialem & in accutum mucronem attenuatam. Panicula ipsa a tribus separatis partibus composita est quarum posterior uno, duobus communiter tribus, constat pedicellis longioribus e vagina prodeuntibus, anterior pars etiam tribus sapissime constat pedicellis, tertia s. media paniculae pars plures sapissime habet pedicellos, statim divaricantes, ceteris breviores quorum origini etiam adjacet vagina.

Hi pedunculi extremo suo aut in alios pedunculos partiales subdividuntur, aut duo vel plura sustinent amenta.

Amenta ovata, imbricata, teretia sensim in accutum mucronem attenuata, lineis quatuor aut quinque longa, composita e squamis ovatis, subcarinatis, bifidis, membranaceis, medio obscuro margine, luteo fuscis, linearum duarum circiter longitudine, uniusque circiter latitudine.

Stamina filamenta tria filiformia aequalia ad basin squamarum cui aequalia inserta, *Anthera* oblonga minima.

Pistil Germen minimum Stylus fili formis Stigmata tria capillaria

Semen unicum, triquetrum intimo latere planum ceteris magis gibbum, ad basin villis v. filamentis tenuissimis cinctum.

Locus habitat in Dania undique, in fluviis, lacubus & aquis stagnantibus, præterea frequens in quam plurimis septentrionalibus locis ubi gelu non attingit radices, ab initio Junii mense ad finem ejus floret & medio v. fine augusti, semen gerit maturum.

Qualitas & Usus Radix hujus plantæ subducis est cum vi astringentia. Culmi usus in medicina nullus cognitus. In æconomia e contrario multiplex est. e. gr. A. rusticis straminis loco pedibus substernitur, etiam straminis vice adhibetur pro tegendis pauperum tuguriis, ad tegetes scabellarum pedum illis utimur, ad cathedrarum sedes, His etiam infarciuntur clitellæ & sustentantur boves, defectu præstantioris pabuli.

Scirpi

♂ Culmo triquetro panicula foliacea

I. Scirpus maritimus Danic. *See Sif.* German See binden: Svec. Haf Sæf.

Cyperus culmo triquetro panicula foliacea, pedunculis simplissimis spicis confertis. Roy Lugd. 50.

Cyperus panicula subsessili, capitulis subovatis Gvett. Stamp. 2. p. 414.

Cyperus rotundus inodorus germanicus Bauh. pin. 14. theat. 215

Cyperus rotundus inodorus anglicus Bauh. pin. 14.

Cyperus

Cyperus panicula compacta e spicis teretibus crassioribus composita Scheuz hist. 400.

Gramen *Cyperoides panicula* sparsa majus Bauh. pin. 6.

Scirpo Cyperus palustris, radice repente nodosa in odora, panicula sparsa, capitulis majoribus Mich. g. 48.

Scirpus culmo triquetro panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis intermedia subulata Lin. Flor. Svec. 39. Spec. plant. 51.

Radix perennis, fibrosa, sub ramosa, de se spargens viticula longa, lineam unam, plus minus crassa, intus albicans & membranacea, extus tunica fusca vestita.

Culmus, erectus, triquetus, ses quipedalis, jam quidem altior, crassitiem habet frequentissime linearem, in structus vagina foliorum, quæ culmum complectitur a radice usque ad spithamale, aut pedale fere spatium. Folia sunt aliquot, quina & sena scilicet ereata, carinata, lineas tres plus minus lata, subtilissime striata & in accutum mucronem attenuata.

Panicula oritur e sinu duorum v. trium foliorum quorum *longius*, & quidem posterius erectum palmarem aut semipedalem habet longitudinem, crassitiemque linearem, *brevius* magis declinatum, & a parte anteriori bipollicarem frequentissime habet longitudinem & semilinearem latitudinem, utra carinata, si deorsum digiti ducantur asperiuscula & sensim in accutum mucronem attenuata.

Hi pedunculi medio excepto oriuntur e membrana bilineari amplexicauli & subfusca.

Unum v. duo folia breviora, si existunt nihil fere aliud sunt, quam squamæ membranaceæ ad basin aristam prolongatam habentes. Pa-

Panicula coarctata, pedunculis quam sapissime constat tribus, trigonis, apice quam basi crassioribus, quorum posterius, & quidem longissimus pollicare v. bipollicare, cujus sumitari unum, v. duo quam sapissime insident amenta. Reliqui duo pedunculi sunt brevissimi vix semipollicarem habentes longitudinem, quorum unus, & quidem medius, quinque v. sex dense congesta sustinet amenta anteriore tantum duo vel tria.

Amenta oblonga, ovata, teretiuscula cylindracea de hinc in mucronem fastigiata, unius v. duarum linearum habent latitudinem & pollicarem v. semipollicarem longitudinem, composita sunt e squamis dense & imbricatis positis, subovatis, carinatis, trifidis & subflucis, bilinearem habentibus longitudinem & linearem latitudinem.

Stamina filamenta tria filiformia receptaculo in ferta longitudine squamarum *Anth.* lineares erectae sulcatae.

Pistil: Germen minimum subtrigonum, Stylus filiformis; Stigma bipartitum filiformis.

Semen intimo latere planum externo gibbum, ad basin tribus villis niveis frequentissime instructum.

Locus habitat in littoribus marinis locisque mari adjacentibus.

II. *Scirpus Sylvaticus* Dan. Cyper. Græs. German. Vald-Læchel. Læchel binsen. Svec. Skogs Sæf

Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis nudis supra decompositis, spicis confertis Roj Lugdb. 49.

Gramen Cyperoides mileaceum Bauh. pin. 6.

Gramen

Gramen arundinaceum, foliis acutissimis panicula multiplici, cyperi facie. Læf. pruss. 119. t. 33.

Scirpus culmo triqvetro folioso, umbella foliosa; pedunculis nudis supra decompositis, spicis confertis, Lin. Fl. Sv. 38. Sp. pl. 51.

Radix fibrosa, veluti lignosa, foris fusca intus subfusca, si dissecetur punctis nigricantibus inter spersa.

Culmus erectus, trigonus, striatus, altitudini sesquipedalis imo bipedalis, crassitiei variæ, ad radicem foliis, vaginisque striatis subfuscis vestitus, a radice ad paniculam usque quinque geniculis quam sæpissime distinctus, a quorum singulo oritur folium substriatum lineare in acutum mucronem attenuatum longitudine pedali, & semipollicari latitudine.

Panicula sparsa, constans pedunculis triqvetris, substriatis, validis, quorum quilibet oritur a quodam producti culmi geniculo, quæ genicula brevissimo ab invicem spatio discreta, a quorum singulo quoque oritur folium, quorum infimum paniculae subiectum reliquis longius, sc. semipedale, lineas duas tresque latum, reliqua sensim breviora evadunt & angustiora. Pedunculi circumdantur basi vagina amplexicauli, quasi truncata subtiliter striata, plus minus unciali, quorum sumitati infidet panicula partialis, brevioribus & tenuioribus pedunculis constans semuncialibus & uncialibus, quorum quilibet prodit ex ala folioli aut vaginulae lineas duas, tres, quatuorque longæ, lineam unam ad basin latæ; Cæterum sunt hi partiales pedunculi reliquis similes, differunt tantum magnitudine;

ne; sumi tati ipsorum, aut panicula subpartialis
aut amenta conferta insident.

Amenta teretia utrinque mucronata respectu cæterorum
minima lineam unam cum dimidia longa &
unam lata, composita e squamis imbricatis, stria-
tis, v. tribus lineis per longitudinem distinctis.

Stamina filamenta tenuissima, insidentia lineis nerveis,
quibus squamæ sunt notatæ Anth. minimæ.

Pistil: Germen minimum, Stylus cirrosus subtilissimus,
glumæ paululum longius; Stigma trifidum

Locus in umbrosis & humentibus Daniæ sylvis ad mar-
gines paludum, in sylva f. d. Gyldenlund & aliis
copiose habitat.



